

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

LP 27-3-64 28901847 IN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

## ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE & OISE, SEINE & MARNE, EURE & LOIR, EURE, OISE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-S-BOIS (Seine) - AVR 76-71  
C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Bulletin n° 42  
Supplément n° 1

25 Mars 1964.

### AVERTISSEMENTS

### CULTURES FRUITIERES

#### TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

Les premiers périthèces arrivent à maturité. Des projections d'ascospores pourront donc se produire au cours des prochaines pluies.

Dans la plupart des secteurs, les variétés hâtives de poiriers ont atteint ou dépassé le stade C3-D, les plus tardives en sont proches. Par contre, c'est seulement dans les secteurs les plus favorisés que les variétés hâtives de pommiers atteignent le stade C3.

En conséquence, un traitement devra être appliqué dès réception, sur les variétés de poiriers ou de pommiers qui ont atteint ou dépassé le stade C3 ; pour les autres variétés le traitement sera appliqué dès l'apparition de ce dernier stade.

### INFORMATIONS

#### CECIDOMYIE DES POIRETTES

Les premières sorties viennent de se produire en élevage. Dans les vergers attaqués ajouter à la bouillie anti-tavelure un des produits choisis parmi ceux conseillés contre l'anthronome. Ce traitement ne doit intervenir que sur les variétés ayant atteint ou dépassé le stade D3.

#### PUCERONS-PSYLLES

Les premiers pucerons noirs ont été observés sur pêchers. Surveiller attentivement les vergers pour intervenir en temps utile sur les arbres fruitiers à pépins et à noyaux. Utiliser un insecticide de contact.

#### MONILIA DE L'ABRICOTIER

De nouveaux traitements doivent être effectués, l'un au stade bouton rose, l'autre à la chute des collerettes.

### CULTURES MARAÎCHERES

#### MOUCHE DES SEMIS

Cet insecte a commis de gros dégâts sur haricots en 1963. Le traitement le plus simple consiste à enrober les semences avec un produit à base de Lindane ou Heptachlore aux doses respectives de 25 et 50 g. de matière active par 100 kg de graines.

L'Ingénieur et l'Agent Technique  
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux,

G. BERGER.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx.  
47, Avenue Paul Doumer - Montreuil S/B (Seine).

P 74